



ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI

Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"

Villa Camozzi – 24020 Ranica (BG) – Italy, tel +39.035.45351 - fax +39.035.4535.371  
villacamozzi@marionegri.it – <http://villacamozzi.marionegri.it>



## Questionario di valutazione dell'apprendimento 20° Meeting GiViTI 26-28 Ottobre 2011

### 1 - Quali sono le possibili problematiche di raccolte dati epidemiologici in terapia intensiva mediante archivi specifici?

- |  |        |
|--|--------|
| a) <b>Attendibilità e precisione del dato raccolto</b> | 96.57% |
| b) Possibilità di effettuare analisi statistiche       | 2.86%  |
| c) Raccolta dati automatizzata                         | 0.57%  |

### 2 - Quali sono i potenziali vantaggi di una cartella clinica informatizzata?

- |  |        |
|--|--------|
| a) <b>Riduzione di errori, condivisione e confronto dei processi, ottimizzazione delle risorse</b> | 97.71% |
| b) Ripercussioni medico-legali   | 0%     |
| c) Possibile valutazione delle attività da parte di un ente esterno                                | 2.29%  |

### 3 - La mortalità dei pazienti con shock settico è:

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| a) 20 - 35%              | 0%     |
| b) attorno al 40%        | 1.14%  |
| c) <b>attorno al 60%</b> | 98.29% |
| d) meno del 50%          | 0.57%  |

### 4 - Indica la frase scorretta

- |   |        |
|---|--------|
| a) La CPFA riduce la risposta infiammatoria acuta nella sepsi   | 13.14% |
| b) <b>E' stato dimostrato che la CPFA riduce significativamente la mortalità dei pazienti con shock settico</b> | 81.15% |
| c) La CPFA si è dimostrata efficace come trattamento dello shock endotossico in modelli animali                 | 5.71%  |

### 5 - Quale è il microrganismo Gram-positivo più frequentemente isolato dal sangue dei pazienti critici:

- |   |        |
|---|--------|
| a) Stafilococco aureo                     | 41.71% |
| b) Corynebacterium JK                     | 0%     |
| c) <b>Stafilococco coagulasi negativo</b> | 57.72% |
| d) Enterococcus spp                       | 0.57%  |

I CONTRIBUTI PER LA RICERCA VERSATI ALL'ISTITUTO SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO (Gazzetta Uff. N.179 del 3/8/2011)  
FONDAZIONE PER RICERCHE ERETTA IN ENTE MORALE, D.P.R. 361 DEL 5/4/1961 - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA MILANO N.227  
CONTO CORRENTE POST. N.58337205 - COD. FISC. E PARTITA IVA 03254210150 - ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE COD.G1690099

RECOGNIZED AS A TAX EXEMPT ORGANIZATION UNDER SECTION 501 (c)(3) OF THE USA INTERNAL REVENUE CODE-TAX I.D. No.: 98-6000957

Sistema di gestione qualità certificato da Certiquality UNI EN ISO 9001:2008,  
progettazione ed erogazione di corsi di formazione specialistica nell'ambito della biologia e della medicina

SEDE LEGALE: Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 Milano MI - Italy



**6 - Secondo la definizione più accreditata in letteratura di “letto intensivo” e “letto sub-intensivo”, qual è il numero massimo di pazienti intensivi che può ricoverare contemporaneamente una TI che ha 8 posti letti, tutti tranne uno attrezzati di ventilatore e monitor, 4 infermieri in turno di giorno e 3 infermieri in turno di notte?**

- |             |               |
|-------------|---------------|
| a) 8        | 0.57%         |
| b) 7        | 2.86%         |
| <b>c) 6</b> | <b>88.57%</b> |
| d) 4        | 8%            |
| e) 3        | 0%            |

**7 - Qual è il rapporto infermieri/pazienti considerato minimo indispensabile in letteratura per definire un livello di assistenza intensiva?**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| a) 1:1        | 0%            |
| b) 1:3        | 1.71%         |
| <b>c) 1:2</b> | <b>98.29%</b> |

**8 - Se un paziente a basso livello di complessità clinica viene ricoverato in un letto ad alta intensità di cure:**

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Si determina un inutile spreco di risorse                                     | 27.43%        |
| b) Rischia di ricevere un trattamento non adeguato ai suoi bisogni assistenziali | 0%            |
| <b>c) Tutte le precedenti</b>  | <b>69.14%</b> |
| d) Nessuna delle precedenti  | 3.43%         |

**9- Se un paziente con una probabilità di morire pari a 16.8% viene dimesso vivo dall'ospedale, nel grafico VLAD si osserva**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| a) Una salita pari a 0.832        | 5.14%      |
| <b>b) Una salita pari a 0.168</b> | <b>88%</b> |
| c) Una discesa pari a 0.832       | 6.86%      |

**10 - In una banda di calibrazione quali sono i punti più ‘critici’?**

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>a) Quelli sopra la bisettrice</b> | <b>90.86%</b> |
| b) Quelli sotto la bisettrice        | 8%            |
| c) Quelli sulla bisettrice           | 1.14%         |

**11 - Se il rapporto fra mortalità osservata in una TI e mortalità attesa secondo un modello di analisi multivariata è uguale a 1, significa che:**

- |  |               |
|--|---------------|
| a) La TI sta erogando un'assistenza di cattiva qualità                                 | 0.57%         |
| b) La TI sta erogando un'assistenza di buona qualità su tutte le categorie di pazienti | 28.57%        |
| <b>c) nessuna delle precedenti</b>   | <b>70.86%</b> |