



GiViTI - Gruppo italiano per la Valutazione  
degli Interventi in Terapia Intensiva

# Cure infermieristiche mancate in terapia intensiva:

protocollo di studio per l'analisi delle determinanti e dei fattori  
associati percepiti dagli infermieri

[www.giviti.marionegri.it](http://www.giviti.marionegri.it)

**Meeting GiViTI 2025**  
8 - 9 - 10 ottobre

Inf. Clara Ripamonti  
Inf. Vincenzo Damico  
Inf. Riccardo Gambaretti  
Inf. Elisabetta Polvara  
Inf. Marco Turani



# Background:

- ▶ Le **Missed Nursing Care (MNC)**, ovvero le cure infermieristiche omesse o ritardate, rappresentano un fenomeno rilevante in ambito sanitario, con potenziali ripercussioni sul paziente e sulla qualità dell'assistenza.
- ▶ In letteratura le MNC sono state associate a fattori quali carenza di personale, sovraccarico lavorativo, burnout e abbandono della professione (Jafari-Koulaee et al., 2024).
- ▶ Recentemente è stato introdotto un nuovo strumento di rilevazione: la scala **MINCS-IT** (De Barbieri et al., 2025), finalizzata a valutare non solo quali sono le MNC e la loro frequenza, ma **anche la percezione infermieristica** sulle cure mancate e sulle loro cause.

BIBLIOGRAFIA



# Obiettivi

- ▶ Identificare le tipologie e la frequenza delle cure infermieristiche mancate.
- ▶ Analizzare i fattori potenzialmente associati alle MNC (carichi di lavoro, turni, variabili organizzative o personali).

# Metodi

STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO

DURATA: Novembre 2025 - Febbraio 2026

PARTECIPANTI: 50 infermieri di terapia intensiva presso l'ospedale Manzoni di Lecco

FREQUENZA: una scheda a settimana per ogni infermiere

Le risposte saranno associate a dati anagrafici  
(sesso, età, anni di esperienza lavorativa)

# Analisi statistica e discussione attesa

- Si prevede di ottenere 400 schede compilate
- Per il confronto tra gruppi saranno utilizzati test parametrici e non parametrici, a seconda delle distribuzioni delle variabili (t-test, ANOVA o Mann-Whitney/Kruskal-Wallis)
- Le associazioni tra MNC e fattori predittivi verranno esplorate mediante regressione logistica multivariata. Il livello di significatività sarà fissato a  $p<0,05$

- Descrivere in maniera sistematica le cure infermieristiche mancate nelle terapie intensive partecipanti
- Individuarne le cause percepite dagli infermieri che hanno compilato i questionari



- Sviluppo di strategie di prevenzione e miglioramento della sicurezza del paziente critico
- Miglioramento della qualità assistenziale
- Migliorare il livello di soddisfazione dell'equipe infermieristica

# Limiti dello studio

- ▶ campione di infermieri ridotto, con alcune aree anagrafiche poco rappresentate

## In futuro..

- ▶ si potrebbe estendere lo studio ad altri centri afferenti alla rete GiViTI, per poter confrontare i risultati ottenuti in realtà con modelli organizzativi diversi e/o afferenti a diversi Sistemi Sanitari Regionali

# Grazie per l'attenzione



Clara Ripamonti, Vincenzo Damico, Riccardo Gambaretti, Elisabetta Polvara, Marco Turani